

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAK İZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Staphylococcus aureus ATCC 6338	Doğrudan Kullanım,	Uygulanacak alanın	Uygulan alanın
Pseudomonas aeruginosa ATCC15442	Kullanıma Hazır Preparat	büyükliğine göre belirlenir.	hiyen durumuna göre
Enterococcus hirae ATCC10541			Günde 1 veya iki defa uygulanır.
Escherichia coli K12 NCTC 10538			
Candida albicans ATCC 10231			

Kullanma şekli:

Deriye ve mukozaya sürülerek kuruması beklenir.
Ruhsat Sahibi firmanın adı ve adresi;

FAKO İLAÇLARI A.Ş.

Esentepe Mah. Ecza Sk. Pol Center No:4120

Levent/İSTANBUL

Tel: 0212 264 08 28

Üretici firmanın adı ve adresi:

MEDİSİN İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

1550.Sokak No:15 İvedik Organize Sanayi

Yenimahalle / ANKARA

Tel: (0) 312 394 64 41 Fax: (0) 312 394 64 41

Net miktarı: (L)

30ml – 50ml – 75ml – 100ml – 150ml – 200ml-250ml-

300ml-500ml-750ml-1L-3L-5L-10L-20L-50L

Ambalajı açılmış ürünü 90 gün içerisinde kullanınız.

Ürünün normal koşullarda raf ömrü 24 Ayrır.

KULLANICI GRUBU
(GENEL HALK)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

FAKO İLAÇLARI A.Ş.

BATİODİX Solüsyon

Formülasyon şekli: Sıvı

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)
(Kimyasal adı; CAS Numarası)

Polyvinilprolidon-lyot(Cas No: 25655-41-8) % 10

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)
Sodium Lauryl Ether Sulfate (Cas No:68585-34-2) % 0,4
Gliserin (Cas No:56-81-5) % 0,8
Deiyonize Su % 88,8

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE
GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA
KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEM EK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

Boş ambalajı imha şekli: Boş ambalajı atmadan önce temiz
suyla çalkalayıp, usulüne uygun imha ediniz. Ambalaj
yeniden kullanılmamalıdır.

ÜRÜN TİPİ (1)

BATİODİX Solüsyon

Zehirlenme belirtileri.

Belirlenmiş zehirlenme belirtisi bulunmamaktadır.

LD₅₀ değerleri

LD50 (oral, sıçan):8000 mg/kg

LD50 (oral, fare):8100 mg/kg

İlk yardım önlemleri

Teneffüs edilirse: Direk ya da fazla soluduğunuzda temiz
hava alınız. Rahatsızlık halinde doktora başvurunuz.

Cilde temas ederse: Rahatsızlık halinde su ile yıkayınız ve
doktora başvurunuz.

Göze temas ederse: Gözler 10-15 dakika bol su ile
yıkamalıdır. Gözlerde kontak lens varsa çıkartıldıktan
sonra bol su ile yıkanmalıdır. Rahatsızlık halinde doktora
başvurulmalıdır.

Yutulursa: Kişiyi kusturmayınız, mümkünse ağzını su ile
çalkalayınız. Rahatsızlık halinde doktora başvurunuz.

Antidot ve gerekli bilgiler

Spesifik bir antidotu yoktur.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR
DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU
TELEFONUNU ARAYINIZ.**

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünü kuru, serin, orijinal ambalajında ve kapalı olarak
muhafaza ediniz. Oda sıcaklığında saklayınız. Gıdalardan
uzakta tutunuz. Işıktan ve yüksek ısıdan koruyunuz.

Sucul organizmalara ve arılara zehirlidir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

Bulunmamaktadır.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

Bulunmamaktadır.

BAKANLIK ONAYI

İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yenimahalle/ANKARA
Tic. Ltd. Şti.
Sitesi 1550. Sokak No: 15 İvedik Organize Sanayi
Yenimahalle A.D. 613 073 2875